

SERPIENTES OPISTOGLIFAS COLÚBRIDOS



Alsophis vudii picticeps

Distribución en México (Subfamilia Crotalinae)

- 64 especies
- 10 géneros

* *Botriechis schegelii* talla mediana (80 cm), arborícola, y colores variados (Neri-Cardozo *et al.*, 2014).

MORDEDURAS DE SERPIENTE EN MÉXICO



- MUNDIAL 50 000 Y 22 000 CASOS AL AÑO
- MÉXICO → PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
- 2003-2007, SE REPORTARON 18,848
- Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
- OAXACA *** 2, 226
- *Crotalus molossus*, *Crotalus atrox*,
- *Crotalus durissus*, *Agkistrodon bilineatus* y *Bothrops asper****.

Hernández y Bravo. 2009

Cuadro Clínico por mordedura de *Crotalus*.



El paciente puede presentar un síndrome neurotóxico, miotóxico y coagulante.

Manifestaciones locales

Se presentan mínimos signos locales caracterizados por leve eritema, acompañado o no de discreto edema a nivel del sitio de hinchamiento de los dientes inoculadores. En este caso no hay dolor, inclusive puede haber hipoestesia o anestesia de la zona mordida.

Manifestaciones generales

Son de instalación generalmente rápida con visión borrosa, diplopía, anisocoria, disminución de la agudeza visual, aptosis palpebral (facies miasténica), dificultad para hablar, mialgias y oscurecimiento de la orina (mioglobinuria). Aproximadamente la mitad de los casos pueden presentar trastornos de la coagulación sanguínea hasta incoagulabilidad y manifestaciones generales como náuseas, vómitos, sudores, somnolencia, inquietud o agitación. En envenenamiento graves pueden producirse parálisis respiratoria e insuficiencia renal aguda. Los signos y síntomas neurológicos se mantienen alrededor de 2 semanas desapareciendo gradualmente sin secuelas aparentes.