



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

“EL SELENIO COMO MICRONUTRIENTE  
EN LA PRODUCCIÓN OVINA”

# TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

PRESENTA  
**AARÓN MONROY CRUZ**

**ASESORES:**

Dr. BENJAMÍN VALLADARES CARRANZA  
Dr. JUAN EDREI SANCHEZ TORRES  
Dr. VALENTE VELÁZQUEZ ORDOÑEZ

Toluca de Lerdo, México, Noviembre 2017



## **DEDICATORIA**

A mis padres.

Saturnino Monroy Alcántara y Verónica Rocío Cruz Cano

Quienes siempre me han apoyado incondicionalmente en la parte moral y económica para poder culminar esta meta.

A mis hermanas y demás familiares

Por él apoyo que siempre me han brindado,  
en el transcurso de cada año de mi carrera...

## **AGRADECIMIENTOS**

Primeramente a la Universidad Autónoma del Estado de México por haber aceptado a ser parte de ella, y abierto sus puertas para poder estudiar mi carrera; así como también a los docentes que me brindaron sus conocimientos y apoyo para seguir adelante día a día.

A mis asesores el Dr. Benjamín valladares Carranza, Dr. Juan Edrei Sánchez Torres y Dr. Valente Velázquez Ordoñez por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimientos, así como también haberme tenido toda la paciencia del mundo para guiarme durante el desarrollo de la tesina.

Y para finalizar agradezco el gesto de amistad, compañerismo y apoyo moral de: Alexis, Adelaido, Franco, Andrea y Pilar entre otros quienes durante toda la carrera, ya que formaron una parte importante para seguir adelante durante mi formación profesional.

**“EL SELENIO COMO MICRONUTRIENTE  
EN LA PRODUCCIÓN OVINA”**

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	ii
AGRADECIMIENTOS.....	iii
RESUMEN.....	vi
INTRODUCCIÓN.....	1
REVISIÓN DE LITERATURA .....	4
JUSTIFICACIÓN .....	13
OBJETIVOS .....	14
MATERIAL.....	15
MÉTODO .....	16
CAPITULO I. GENERALIDADES SOBRE EL SELENIO (Se). .....	17
CAPITULO II. REPORTES SOBRE EL EFECTO DEL SELENIO EN CORDEROS Y EN LA OVEJA. ....	22
CAPITULO III. PARTICIPACION DEL SELENIO EN LA RESPUESTA INMUNOLOGICA EN CORDEROS.....	25
LÍMITE DE ESPACIO .....	31
XI. LÍMITE DE TIEMPO.....	32
LITERATURA CITADA .....	33

## RESUMEN

### “EL SELENIO COMO MICRONUTRIENTE EN LA PRODUCCIÓN OVINA”.

Aarón Monroy Cruz. Dr. Benjamín Valladares Carranza, Dr. Juan E. Sánchez Torres y Dr. Valente Velázquez Ordoñez.

Para la estructuración del presente trabajo, que corresponde a una revisión bibliográfica, se recopiló información sobre el micronutriente selenio (Se), metaloide que se encuentra en la naturaleza en estado puro o asociado al azufre, hierro y cadmio; esencial para plantas y animales, previene miódistrofias del ganado, diátesis hemorrágica exudativa en aves, alteraciones hepáticas en rata y cerdo; también interviene en el crecimiento, fertilidad y es un efectivo agente terapéutico en enfermedades severas de la glándula mamaria, reduciendo la incidencia de mastitis. El Se involucrado con la vitamina E mantiene las funciones de las paredes celulares y de las membranas orgánicas.

El Se tiene un efecto positivo sobre la ganancia de peso e incremento en la fertilidad de las ovejas, el número de corderos nacidos, así como un mayor peso vivo al nacimiento, cuando se mantienen niveles adecuados de selenio en la dieta o por la aplicación de una dosis óptima de selenito de sodio (0.05 ppm). En algunos países se ha vuelto una práctica normal dosificar a ovejas con selenito de sodio como preventivo, principalmente contra el desarrollo de enfermedades de músculo blanco, en ovejas a razón de 10 mg de Se antes del mes de apareamiento y nuevamente 5 mg de Se un mes antes del nacimiento del cordero, mientras que en corderos la recomendación es dosificar con 5 mg de Se al marcado o destete y a los 6 meses de edad. En estudio para evaluar la toxicidad aguda del Se administrado en forma parenteral, se demostró que la dosis  $DL_{50}$  fue de 0.8 mg Se/kg de peso corporal, encontrándose por arriba de la reportada en la literatura bajo la misma forma de administración con dosis de  $DL_{50}$  0.455 mg Se/kg de peso corporal, determinando, que esta variación es debida a factores asociados con la dieta y la susceptibilidad individual del animal. Estudios que correlacionan la suplementación de Se, con la ganancia de peso corporal, en áreas designadas como marginalmente selenodeficientes, los corderos mostraron

una pequeña pero significativa respuesta en el peso con la dosis de selenito de sodio de 10 mg Se/cordero por mes, en la cual se obtuvo un promedio de ganancia de peso de 1.2 kg para el grupo control y de 2.3 kg para el grupo tratado con Se, desde el inicio de la prueba hasta 6 semanas después, estableciendo que la respuesta no es evidente hasta antes de los 3 meses de edad, donde la pequeña significancia en la respuesta al peso con la dosis de Se está asociada con el promedio de los niveles de Se en sangre; mientras que en otro estudio, en el que aplicaron Se-vit. E con un tratamiento antihelmíntico simultáneo se obtuvo una ganancia de peso de 5.48 kg (17.35%) más que el grupo control.

El Se puede ser responsable de alterar la respuesta inmune, en corderos que muestran niveles bajos de Se y vitamina E en sangre, con baja actividad de GSH-Px presentaron una disminución de los niveles de inmunoglobulinas, baja actividad fagocitaria, y mayor destrucción de los macrófagos; la pobre actividad de la GSH-Px sanguínea incrementan la destrucción de las células linfoides por los altos niveles de peróxidos circulantes. En estudio usando como modelo la afección por bacterias que causan gubarro (*Dichelobacter nodosus*, bacteria que en muchos casos se encuentra asociada a *Fusobacterium necrophorum*), en ovinos estabulados y en pastoreo, demostraron que la suplementación superior a los niveles recomendados en ovejas con Se-levadura a razón de 24.5 mg Se/kg mejoró el crecimiento de los corderos y la salud de las ovejas en comparación con los niveles máximos permitidos por la FDA. En este estudio, la suplementación de Se no previno la infección de gubarro, sino que, mejoró la función inmune innata y humoral que había sido valorada, en donde se encontraban afectadas negativamente por la infección. Se necesita continuar evaluando la suplementación de Se, y determinar si tiene efecto adicional sobre la respuesta inmune innata y adaptativa y proporciona protección contra otros patógenos bacterianos o virales.

**Palabras clave:** Selenio, producción ovina, ganancia de peso, inmunidad, ovinos.

## INTRODUCCIÓN

La ovinocultura es una actividad socioeconómica importante en el Estado de México, sin embargo la forma tradicional de producción ha limitado su desarrollo y expansión en la mayoría de las unidades de producción. Generalmente los ovinos bajo condiciones de pastoreo, son alimentados con pastos nativos, residuos de cosechas y en menor proporción con pastos inducidos, y una baja o escasa suplementación (Almanza, 2004; SIAP, 2008).

Estas condiciones predisponen a la presentación de enfermedades nutricionales. Dentro de estas, las relacionadas con los microminerales; reduciendo la manifestación del potencial productivo y reproductivo de los animales, sobre todo en las etapas más críticas de desarrollo (Almanza, 2004; Underwood y Suttle, 2002).

Dentro de los rubros más importantes para eficientar la producción ovina se considera realizar un adecuado manejo nutricional, ya que este absorbe entre el 60-70% del costo de producción. En México la alimentación de los ovinos se basa principalmente en el consumo de plantas forrajeras, que cuando no son la única fuente de nutrientes, constituyen la mayor parte de la dieta. Bajo estas condiciones, la producción está determinada por la disponibilidad de alimento y el valor nutritivo de los forrajes llámese proteína, energía, vitaminas o minerales (Almanza, 2004; SIAP, 2008).

La concentración de elementos minerales en forrajes y granos empleados para la nutrición de los ovinos, depende en gran medida de la proporción existente de estos elementos en el suelo; del tipo de suelo, así como de la interacción de todos los elementos entre sí. Las deficiencias de minerales en la dieta, determinan la presencia de diversos padecimientos carenciales, que se manifiestan en forma subclínica o clínica en los animales, lo que repercute directamente en el



desempeño zootécnico (Domínguez y Huerta, 2008; NCR, 2007).

Las deficiencias de macroelementos como el calcio, el fósforo y el magnesio, son comunes cuando los animales son pastoreados en zonas deficientes, si la suplementación de estos minerales no se lleva a cabo o bien, cuando la formulación de la ración es incorrecta, se afecta de manera seria el crecimiento de los animales, manifestándose como raquitismo, osteomalacia y osteoporosis. Por otro lado también se produce un desajuste en la cantidad normal de otros elementos, como el desequilibrio del calcio y del fósforo, ocasionando disminución de la producción de energía en el rumen, agravando más el problema nutricional, que se manifiesta en un pobre desempeño productivo y reproductivo (Church *et al.*, 2002; Domínguez y Huerta, 2008).

Elementos de vital importancia en la nutrición de los rumiantes son los minerales traza (Son elementos que se requieren en pequeñas cantidades en la dieta y su determinación en los organismos es difícil; como el caso del selenio, cobre, cobalto, flúor, yodo, manganeso y zinc), los cuales desempeñan un papel importante en el equilibrio nutricional. Actúan como componentes estructurales de órganos y tejidos corporales; en fluidos en forma de electrolitos, que intervienen en el mantenimiento de la presión osmótica, del equilibrio ácido básico, de la permeabilidad de las membranas y de la irritabilidad tisular y como catalizadores en sistemas enzimáticos y hormonales, en forma de componentes integrales y específicos de la estructura de metaloenzimas (Church *et al.*, 2002; FDA, 2012; Hall *et al.*, 2012).

El aporte deficiente de selenio, cobre, hierro, azufre y zinc ocasiona importantes trastornos metabólicos ante el cual los ovinos son muy susceptibles, reflejándose clínicamente por anorexia, emaciación, retardo en el crecimiento, anemia, trastornos locomotores, bajas tasas reproductivas y alta mortalidad en el

período perinatal y posnatal (Hoffmann, 2007; Mehdi *et al.*, 2013). La presentación de cuadros caracterizados por un retraso en el crecimiento, emaciación progresiva y alteraciones locomotoras, se ha relacionado con la deficiencia de selenio/vitamina E (Ibeagha *et al.*, 2009; Humann-Ziehank *et al.*, 2013).

El objetivo del presente trabajo es reunir y analizar información sobre el papel del selenio como micronutriente en la producción pecuaria, considerando la esencialidad de este micronutriente en el aspecto productivo y de protección inmunológica en los ovinos como especie productiva, y de interés para los productores del Estado de México.

## REVISIÓN DE LITERATURA

Nutricionalmente a los minerales se les ha ubicado como el tercer factor más limitante en la producción animal; los desbalances minerales en suelos y forrajes son considerados responsables de la baja producción y de los problemas reproductivos en los rumiantes (Hall *et al.*, 2013a; Mainville *et al.*, 2009). Los forrajes rara vez satisfacen las necesidades del animal para cada mineral, ocasionando dicho desequilibrio que afecta a la producción pecuaria (Freeman *et al.*, 2006), considerando que las necesidades de todos los minerales son similares en todas las especies, con una variabilidad mínima de acuerdo a su etapa de crecimiento o ciclo reproductivos. Las necesidades de cada uno de los minerales se determinan por la especie, edad y peso del animal, su estado fisiológico (raza, sexo, crecimiento y preñez), y por el tipo de producción (Church *et al.*, 2002; Domínguez y Huerta, 2008).

A nivel mundial, los procesos de agotamiento, postración, pérdida de pelo, desordenes de la piel, aborto no infeccioso, diarrea, anemia, pérdida del apetito, anormalidades óseas, tetania, baja fertilidad y el consumo de sustancias no nutritivas (tierra), son signos clínicos que sugieren deficiencias minerales. Los minerales son elementos inorgánicos que constituyen las cenizas cuando los tejidos y vegetales son completamente incinerados; estos elementos minerales son nutrientes esenciales para todos los organismos. Los elementos minerales forman parte esencial de un organismo, ningún animal puede mantenerse sano y menos producir si presenta un desequilibrio mineral (Underwood y Suttle, 2002; Spears, 2003).

La mayoría de los elementos minerales tienen múltiples funciones en el metabolismo y su actividad metabólica es afectada o está relacionada a otros minerales y vitaminas u hormonas. Los minerales son importantes y necesarios para transformar la proteína y energía de los alimentos en componentes del organismo o de productos animales como leche, carne y lana, por lo que permiten

el mantenimiento y producción animal. Los minerales ayudan al organismo a combatir las enfermedades y mantener la salud, la productividad de los animales lo que requiere de una mayor atención, para su suplementación o suministro en cantidades apropiadas y biológicamente utilizables (Underwood y Suttle, 2002; Spears, 2003; Whanger, 2002; Zhou *et al.*, 2013).

En condiciones normales todo organismo requerirá de elementos minerales para realizar procesos vitales normales. Bioquímicamente, los minerales tienen funciones orgánicas, en forma elemental o incorporados en compuestos específicos como el Ca, P, Mg, Na, K, S, Cl, Fe, Co, Cu, I, Mn, Se y Zn, estas funciones en fisiología animal están interrelacionados y equilibrados entre si y raramente pueden considerarse como elementos aislados con papeles independientes y autosuficientes en procesos organizados del cuerpo animal. Así, los minerales juegan un papel importante en la relación definida de Ca, P y Mg en la formación ósea y dental; la del Fe, Cu, y Co (en la vitamina B12) en la síntesis de hemoglobina y en la formación de glóbulos rojos; el Na, K, P y el Cl desempeñan funciones individuales y colectivas específicas. El Na, K y el Cl participan en el desequilibrio acido-básico y en la regulación osmótica de fluidos corporales; de modo que el I y Co son parte integral de la vitamina B12; sin embargo la tiroxina y la vitamina B12 están íntimamente implicados en procesos relacionados con otros muchos nutrientes orgánicos e inorgánicos, el S es necesario para la síntesis de proteínas estructurales, el Fe es también importante como constituyente del grupo hem, parte esencial que interviene en la respiración. Otros elementos forman parte de sistemas enzimáticos o de transporte de sustancias como el Zn, Cu, Fe y Se (Underwood y Suttle, 2002; Huang *et al.*, 2007; Eun *et al.*, 2013).

Los macro elementos forman parte de las estructuras tisulares, los oligoelementos están presentes en pequeñas cantidades en los tejidos vivos y

actúan como catalizadores en los sistemas enzimáticos o como cofactores, su función principal varía desde un simple efecto iónico, hasta una asociación específica en las metalo-enzimas, un cierto número de elementos está ligado a las proteínas, mientras que otros están ligados a las metalo-enzimas específicas (diversas oxidasas para el Cu y anhidrasa carbónica para el Zn) (Underwood y Suttle, 2002; Pavlata *et al.*, 2011; Netto *et al.*, 2014).

Desde el punto de vista nutricional son muy importantes en los rumiantes y son necesarios para los microorganismos del tracto gastrointestinal (TGI) que requieren de los siguientes elementos: P, Ca, Mg, Na, K, S, Fe, Mn, Cu, Co, Mo y I. Los minerales requieren de una atención específica dentro de la nutrición animal, ya que son necesarios para mantener el equilibrio corporal, requerido para el metabolismo basal y el desempeño de los diferentes procesos metabólicos en el organismo, en estas condiciones la alimentación asume una importancia en el ajuste de las deficiencias que pueden manifestarse (Underwood y Suttle, 2002; Pavlata *et al.*, 2011).

El aporte deficiente de selenio, cobre, hierro, azufres y zinc ocasiona importantes trastornos metabólicos ante el cual los ovinos son muy susceptibles, reflejándose clínicamente por: anorexia, emaciación, retardo en el crecimiento, anemia, trastornos locomotores, bajas tasas reproductivas y alta mortalidad en el período perinatal y posnatal (Underwood y Suttle, 2002; NRC, 2007; Pavlata *et al.*, 2011).

Para el caso específico del selenio, su contenido varía ampliamente en los suelos, y en consecuencia en los pastos nativos, lo cual depende en gran medida de su origen geológico. La intensidad de una respuesta particular varía con los distintos minerales, diferentes especies o variedades vegetales, y con el suelo y condiciones climáticas, aunque la razón primordial para la existencia de zonas con

deficiencias minerales en los animales que consumen pastos, tales como las de fósforo, cobalto y selenio, se deben a que los suelos de tales zonas son inherentemente pobres en aportes de éstos minerales disponible para las plantas (Hall *et al.*, 2009; Khanal y Knight, 2010; Mehdi *et al.*, 2013).

Dependiendo de la actividad o utilización del suelo, concentraciones de 0.1 a 0.5 ppm de selenio se consideran adecuadas; niveles de 0.024 a 0.096 ppm son deficientes y de acuerdo al análisis físico-químico del suelo se ha observado que a medida que aumenta la cantidad de arena en el suelo disminuye el selenio; de la misma forma la cantidad de arcilla afecta positivamente su concentración (Hall *et al.*, 2009). Los forrajes y cereales desarrollados en estas zonas casi siempre tienen un contenido bajo de selenio (inferior a 0.1 ppm), en contraste con la concentración en cultivos (superior a 0.1 ppm) desarrollados en zonas donde el selenio del suelo disponible es mucho mayor y generalmente adecuado. Los niveles de selenio en forrajes y granos en forma adecuada son de 0.1 ppm; en una forma moderada de 0.075 a 0.1 ppm; en un estado bajo 0.05 a 0.075 ppm y en un estado deficiente 0.05 ppm (Alimohamady *et al.*, 2013). Algunos factores reducen la disponibilidad de selenio en el suelo para las plantas. El pH del suelo (la alcalinidad favorece la absorción de selenio por las plantas), y hechos tales como las inundaciones, y la presencia de un nivel elevado de azufre, que compite por los sitios de absorción con el selenio tanto en las plantas como en los animales, reducen su disponibilidad (Wu *et al.*, 2007; Khanal y Knight, 2010).

La función bioquímica del selenio (Se), es actuar como componente de la enzima Glutatió n Peroxidasa (GSH-Px). La actividad de esta enzima en eritrocitos guarda relación directa con la concentración sanguínea de selenio en mamíferos y aves. La enzima contiene 4 átomos de selenio por mol de enzima y la función precisa de la GSH-Px es participar en la protección de células; destruyendo agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno y peróxidos lípidos que son

capaces de causar desnaturalización irreversible de proteínas celulares esenciales, lo que provoca degeneración y necrosis (Ghaffari *et al.*, 2011; Hall *et al.*, 2014). Esta interdependencia de la actividad de GSH-Px sobre la presencia de selenio puede explicar la interrelación de selenio, vitamina E y aminoácidos que contienen azufre, pueden ser precursores del Glutati6n, que a su vez actúa como substrato de la GSH-Px y mantiene grupos sulfhidrilo en la c6lula (Podoll *et al.*, 2002; Ferguson y Karunasinghe, 2011).

Los aminoácidos que contienen azufre y la vitamina E presentes en la dieta actúan sinérgicamente con el selenio para proteger a los tejidos contra daños oxidativos. Es evidente que la Glutati6n Peroxidasa que depende del selenio presente en la dieta, desempeña un papel importante en la destoxicaci6n de per6xidos l6pidos reduciéndolos a hidroxiaácidos grasos no t6xicos y que la vitamina E evita la formaci6n de ácidos hidroper6xido grasos (Ferguson y Karunasinghe, 2011; Hall *et al.*, 2014).

Cuando existe deficiencia de selenio los niveles plasmáticos de los per6xidos se incrementan rápidamente causando daño en los endotelios capilares, gl6bulos rojos, c6lulas plasmáticas y fibras musculares, modificando el estado homeostático celular al dañar la actividad metabólica de la membrana (Ferguson y Karunasinghe, 2011; Hall *et al.*, 2014).

La presencia de altos niveles de ácidos grasos polinsaturados en la dieta, aumenta los requerimientos de vitamina E, y con un nivel inadecuado de selenio en ella se produce oxidaci6n tisular que provoca degeneraci6n y necrosis celular. Adem6s de que las dietas deficientes de selenio y vitamina E permiten la lipoperoxidaci6n tisular extensa, que provoca degeneraci6n hialina en fase aguda y calcificaci6n de fibras musculares en casos cr6nicos. La destrucci6n de c6lulas musculares permite la salida de enzimas intracelulares a la circulaci6n por lo que

se puede detectar CPK (creatinin fosfokinasa), TGO (aminotranferasa glutámico-oxalacética), LDH (lactato deshidrogenasa) y otras enzimas en suero, constituyendo de esta forma pruebas rápidas en el paciente vivo para la detección de estos padecimientos (Qin *et al.*, 2007; Ferguson y Karunasinghe, 2011; Hall *et al.*, 2014).

Las concentraciones de selenio en diferentes tejidos constituyen buenos indicadores del nivel de este mineral en el animal; los valores fluctúan con el consumo dietético del elemento, niveles de 1.0 ppm en la corteza renal y 0.1 ppm o más en el hígado (materia húmeda) se encuentran en el límite y 0.02 ppm representa una deficiencia grave. Rangos de concentración (en base seca) en hígado de 0.2 - 0.7 ppm; en corteza renal 1.0 - 2.1 ppm; en corazón 0.09 - 0.2 ppm, y en músculo 0.1 - 0.5 ppm indican cantidades adecuadas de selenio en los ovinos (Hall *et al.*, 2014).

Durante la etapa de gestación las ovejas que no reciben el aporte adecuado de selenio durante el último tercio, pueden procrear corderos débiles al parto con degeneración del sistema músculo esquelético, atrofia gradual de las masas musculares y hepatitis. Los ovinos con deficiencia de selenio y vitamina E, muestran disminución de la actividad de la Glutación Peroxidasa, deficiencias en la captación de la glucosa por las células, fragilidad de las membranas, altas concentraciones de metahemoglobina y por lo tanto estados de hipoxia celular (Ramírez *et al.*, 2004; Hall *et al.*, 2009 y 2013b).

La miopatía nutricional degenerativa también denominada enfermedad del músculo blanco, debido a la decoloración de las masas musculares afectadas, ocasiona problemas locomotores en los animales. Esta enfermedad llamada también paso rígido de los corderos, tiene distribución mundial, afecta a animales jóvenes, generalmente localizados en latitudes templadas. En algunas zonas su



incidencia es baja, estacional y esporádica; y en otras zonas la incidencia es más elevada y persistente, afectando en algunos casos al 10% o más del rebaño, sobre todo se ha observado alta incidencia en rebaños con un manejo extensivo sin suplementación (Beilstein y Whanger, 2005; Burk y Hill, 2009; Gresáková *et al.*, 2013).

Los signos clínicos dependen de la extensión y severidad de las lesiones en músculo esquelético y cardíaco. Los corderos con problemas musculares no se pueden mantener en pie y por lo tanto mueren de inanición o por complicaciones secundarias como neumonía. Los animales tienen una muerte súbita debido a un infarto (si la lesión principal ocurre a nivel de miocardio), además es frecuente observar anemia y edema general que determina en forma característica la presencia de ascitis (Beilstein y Whanger, 2005; Burk y Hill, 2009; Gresáková *et al.*, 2013).

Macroscópicamente los músculos se observa pálidos y entre las fibras existen áreas con estriaciones blanquecinas o amarillentas, que al tacto son firmes. En casos agudos los músculos se ven hinchados y hay áreas edematosas y hemorrágicas. Las lesiones musculares generalmente tienen una distribución bilateral simétrica en los músculos de mayor actividad (Beilstein y Whanger, 2005; Burk y Hill, 2009; Gresáková *et al.*, 2013).

Histológicamente se observan áreas con variación en la coloración de las fibras musculares; en estas áreas pálidas se observa pérdida de la estriación y que un material homogéneo hialino, reemplaza al tejido normal. Las fibras periféricas en estas zonas se ven hinchadas y sus fibras tienen una apariencia granular, el núcleo de estas fibras ocasionalmente está picnótico. Adicionalmente se pueden observar áreas de edema y hemorragia. Es característica la proliferación de núcleos de las células musculares en las zonas de la lesión que

corresponde a la proliferación de células mioblásticas e infiltración mononuclear y en casos crónicos se observa precipitación de calcio en las zonas de necrosis (Beilstein y Whanger, 2005; Burk y Hill, 2009; Gresáková *et al.*, 2013).

Las carencias nutricionales de este elemento se encuentran relacionadas con la disminución de ciertos parámetros zootécnicos como: infertilidad, bajos índices de nacencia por muerte embrionaria, aumento en la mortalidad perinatal y bajas ganancias de peso en el nacimiento y durante el desarrollo, además de retención placentaria (Chung *et al.*, 2007; Conzález- Calvo *et al.*, 2014).

Además, la deficiencia de selenio en los corderos se refleja clínicamente como: retraso en el crecimiento, baja conversión alimenticia, cuadros de caquexia progresiva y problemas en miembros locomotores, además se ha observado que los corderos selenodeficientes demuestran inmunodepresión, sobre todo disminución de la concentración de IgG sérica tornándose más susceptibles a procesos patológicos durante estas etapas (Turner *et al.*, 1998; Stewart *et al.*, 2012; Hall *et al.*, 2013b).

En la actualidad, el área de la inmunonutrición tiene el objeto de mejorar la inmunidad y aumentar la resistencia a las enfermedades (Hall *et al.*, 2013 a y b).

Las regulaciones actuales de la FDA (por sus siglas en inglés: Administración de Alimentos y Medicamentos) limitan la cantidad de suplementos con Se dietéticos, independientemente de la fuente química, a razón de 0.3 mg/kg en la ración diaria. Varios investigadores han estado interesados en los niveles superiores a los recomendados de Se, para determinar si la suplementación de Se en concentraciones por encima de los recomendados actualmente para ovinos pueden modular la respuesta inmune de una manera que reduzca la gravedad o mejore la recuperación de un proceso de enfermedad (Hoffman, 2007; Qin y Huang, 2007; Eun *et al.*, 2013; Zhou *et al.*, 2013).

Es importante considerar que el selenio es un constituyente de la Glutación Peroxidasa (GSH-Px) y la actividad de ésta tiene una correlación positiva con el estado de selenio a nivel de los tejidos de bioacumulación, por lo que la disminución significativa de esta enzima ocurriría un aumento en los niveles plasmáticos de peróxidos responsables del daño al endotelio capilar, glóbulos rojos, células plasmáticas y fibras musculares entre otros tejidos (Evenson *et al.*, 2004).

En estudios realizados en ovejas de segundo parto en período de lactancia, mostrando una notable disminución en la actividad de la Glutación Peroxidasa y por lo tanto disminución del nivel de selenio en sangre; además corderos procedentes de problemas por deficiencia de selenio se agravan en las generaciones subsecuentes; observándose clínicamente en los corderos la presentación de corpúsculos de Heínz y Anemia hemolítica (Juniper *et al.*, 2008 y 2009).

La función bioquímica del selenio como componente estructural de la enzima GSH-Px es participar en la protección celular destruyendo agentes oxidantes, tales como peróxidos de hidrógeno y peróxidos lípidos, que son capaces de causar desnaturalización irreversible de proteínas celulares esenciales, lo que provoca degeneración y necrosis. Esta interdependencia de la actividad de GSH-Px sobre la presencia de selenio puede explicar la interrelación de selenio, vitamina E y aminoácidos que contienen azufre, que pueden ser precursores del glutatión, que a su vez actúa como substrato de la GSH-Px y mantiene grupos sulfidrilo en la célula, actuando sinérgicamente para proteger a los tejidos contra daños oxidativos (Hall *et al.*, 2014; Netto *et al.*, 2014).

## JUSTIFICACIÓN

La producción ovina en el Estado de México tiene gran importancia, y la deficiencia, así como el aporte esencial del selenio como micronutriente repercute drásticamente en la producción ovina; además de que sigue representando un serio problema la miopatía nutricional degenerativa, por lo que es importante contar con información relevante sobre las condiciones de este micromineral para la producción de ovinos en zonas específicas lo cual puede orientar a disminuir las pérdidas económicas de los productores ovinos.

En la actualidad las investigaciones sobre este micro elemento resultan de gran interés para fin reproductivo-productivo, así como en la evaluación de diferentes compuestos que contengan el micromineral, por las dosis y eficiencia que puede obtenerse en el tracto digestivo de los ovinos, así como el compuesto en caso de ser suplementado por vía parenteral; sin embargo es importante destacar que existen diferentes factores que deben reconsiderarse por que una mala dosificación puede ocasionar toxicidad severa e incluso ocasionar muerte en los rebaños; la periodicidad es también otra condicionante influenciada por la deficiencia o carencia del mineral en áreas de pastoreo.

Por la acción y el efecto en la producción ovina del selenio, resulta de interés el considerar el papel de este micronutriente sobre el óptimo funcionamiento celular e inmunológico que puede prevenir contra ciertos padecimientos que son frecuentes en los rebaños, y con los reportes de investigación relacionados se podrían correlacionar y utilizar en áreas ovinas del Estado de México.

## **OBJETIVOS**

- Realizar una revisión sistemática, análisis y síntesis de la evidencia bibliográfica sobre la importancia del selenio en la producción ovina.
- Aportar información sobre la esencialidad productiva y de protección inmunológica del micronutriente selenio.

## **MATERIAL**

Para la elaboración de la presente tesina se utilizó información de tipo bibliográfico obtenido de:

- Artículos científicos de revistas
- Artículos científicos e información de Internet y base de datos, como: PubMed, Blackwell Synergy, ISI Web of Knowledge, CAB Abstracts y de Medline.
- Libros
- Memorias de congresos y reuniones de investigación.

Además del equipo de cómputo: computadora e impresora; USB, cd's, hojas, lápices y bolígrafos.

## MÉTODO

El trabajo consistió en seleccionar la información, y ubicarla a través de internet (buscadores: PubMed, Blackwell Synergy e ISI Web of Knowledge), y en las bases de datos (CAB Abstrac y Medline), a los principales descriptores de interés: selenio, inmunidad, ovinos; los conectores booleanos utilizados fueron: and, or y review.

Se identificó, seleccionó, recopiló y analizó la información para ordenarla mediante la elaboración de fichas de trabajo.

Una vez recopilada la información, se organizó para presentarla de acuerdo a los capítulos que integraran el trabajo, los cuales fueron:

CAPÍTULO I: Generalidades sobre el selenio (Se).

CAPÍTULO II: Reportes sobre el efecto del selenio en corderos y en la oveja.

CAPÍTULO III: Reportes de la participación del selenio en la respuesta inmunológica en corderos.

## CAPITULO I. GENERALIDADES SOBRE EL SELENIO (Se).

El selenio es un elemento químico, con símbolo Se, número atómico 34 y peso atómico 78.96; es un metaloide que se encuentra en la naturaleza en estado puro o asociado al azufre, hierro y cadmio. Es un micronutriente esencial para plantas y animales, previene miódistrofias del ganado vacuno, ovino y equino (Underwood y Suttle, 2002; Beilstein y Whanger, 2005); la diátesis hemorrágica exudativa de los pollos, alteraciones hepáticas en rata y cerdo, y el síndrome lipohepático de los pollos; también interviene en el crecimiento, fertilidad y es un efectivo agente terapéutico en enfermedades severas de la glándula mamaria, reduciendo la incidencia de mastitis (Velázquez *et al.*, 2015).

En el selenio como metaloide se conocen 3 estados de oxidación: selenato, selenito y seleniuro, además de encontrarse como selenio elemental, estos son rápidamente fijados por el sistema suelo-planta y de esta forma es fácilmente asimilado por el animal (Ghaffari *et al.*, 2011; FDA, 2012).

En su forma orgánica, el selenio al igual de lo que sucede con otros microelementos, se une firmemente a los compuestos orgánicos, especialmente a las proteínas, formando selenoproteínas o puede sustituir al azufre en los aminoácidos: cistina y metionina para formar selenocistina o selenometionina (Humann-Ziehank *et al.*, 2013).

La forma inorgánica de selenio (selenito de sodio) es la más común y económica utilizada para la suplementación en los animales (FDA, 2012); se incorpora exclusivamente dentro de las selenoproteínas como un aminoácido específico, la cisteína, por sustitución del selenio por una molécula de cisteína residual de la proteína (Ferguson y Karunasinghe, 2011); las cuales en el organismo se localizan en hígado, bazo, riñones, músculos y hemoglobina (Podoll



*et al.*, 2002; Liu *et al.*, 2012). Ambas formas orgánicas e inorgánicas proporcionan selenio al organismo y el exceso es excretado o exhalado.

El selenio se encuentra involucrado con la vitamina E para mantener las funciones de las paredes celulares y de las membranas orgánicas. La vitamina E actúa como antioxidante, previniendo el daño oxidativo de los lípidos sensibles de la membrana celular y disminuye la formación de hidroperóxido (Hall *et al.*, 2012); mientras que el selenio forma parte del sistema enzimático de antioxidación que opera en los líquidos de la célula (Juniper *et al.*, 2008), esta interacción previene de algunas enfermedades de origen nutricional causadas por su deficiencia (Hall *et al.*, 2013b).

En el organismo la vida media del selenio difiere según el tejido, por ejemplo, en hígado y riñón es de 8 a 14 días y en músculo de 18 a 28 días, estableciéndose que la vida media del mineral en los eritrocitos y el plasma, es de 18 a 23 días (Dangla, 1994). Por otra parte se menciona que no existe acumulación en el sitio de aplicación, cuando se administra por vía parenteral. Otros reportes indican que la vida media del selenio en los eritrocitos y el plasma con dosis altas de selenio es de 27 a 31 días (Freeman *et al.*, 2006).

El selenio tisular alcanza mayores concentraciones en corderos alimentados con dietas que contienen selenio natural, que cuando el mismo nivel de selenio es proporcionado mediante la suplementación de dietas pobres en selenio con selenito de sodio (Netto *et al.*, 2014). En corderos y terneros las concentraciones hepáticas y renales de este micro mineral aumentan hasta 5 veces en 1 a 4 días después de inyectar vitamina E y preparados de selenio, volviendo a sus niveles normales en 30 días (Spears. 2003).

En la administración prolongada, el selenio se encuentra en el pelo y pezuñas; así como en la leche fijado a la caseína, proporcionando una fuente importante al animal lactante, además del que reciben durante el desarrollo fetal (Pavlata *et al.*, 2011).

La mayor parte del selenio que aparece en el plasma y en los eritrocitos de las ovejas, se encuentra asociado a la selenoenzima Glutación Peroxidasa (GSH-Px), la cual presenta un peso molecular de 88.0 kDa, contiene 4 átomos de selenio por subunidad de proteína con un peso molecular de 22.9 kDa (Ferguson y Karunasinghe, 2011), es una enzima soluble presente en el citosol y matriz mitocondrial, la mayor actividad se mantiene en los eritrocitos con una elevada correlación con la concentración de selenio en sangre completa. La Glutación Peroxidasa (GSH-Px) tisular responde de forma diferente ante diversos niveles de selenio dietético dependiendo del tejido específico, de la edad del animal o bien del tipo de dieta en algunas especies como bovinos y ovinos (Ramírez *et al.*, 2004; Qin *et al.*, 2007). Los aminoácidos que contienen azufre pueden ser precursores de glutación, que a su vez actúa como sustrato de la GSH-Px y mantiene grupos sulfidrilo en la célula (Khanal y Knight, 2010).

Los niveles de selenio en sangre que se utilizan para establecer un criterio de diagnóstico, sugieren que valores menores de 0.05 ppm. son deficientes; más de 0.05 a 0.075 ppm bajos; de 0.076 a menos de 0.1 ppm. son marginales y de 0.1 a 0.2 ppm son adecuados (Ramírez *et al.*, 2004).

La concentración de selenio en los tejidos varía: con el tipo de tejido y con la cantidad y forma química del selenio en la dieta (Spears, 2003), por lo que se ha establecido que el principal órgano de almacenamiento es el riñón con 0.296 ppm, 0.196 ppm en hígado, en músculo cardíaco de 0.096 ppm y 0.028 ppm en músculo esquelético, en el tejido adiposo su concentración es muy baja porque tiende a

asociarse con proteínas; estableciendo que estas concentraciones en cada órgano implica que el selenio retenido es directamente proporcional con la dosis de selenio administrado (Beilstein y Whanger, 2005; Stewart *et al.*, 2012); determinando además que estas concentraciones en niveles deficientes predisponen a la presentación de trastornos de tipo miopatía nutricional congénita con una mayor incidencia en corderos de 0 a 45 días (Kumar *et al.*, 2009).

El selenio se absorbe a través del intestino principalmente entre el duodeno y el íleon y por inhalación a través de la vía aérea en los pulmones, cuando se encuentra en compuestos en forma de humos o vapores, circulando por el torrente circulatorio uniéndose a las proteínas plasmáticas (Spears, 2003). Este proceso en los animales rumiantes se ve alterado por el microambiente ruminal donde el elemento es oxidado por su actividad biológica propia, originando una forma de selenio elemental (reducido) que es pobremente absorbido, reportándose que solo el 29 al 54% del selenio de la dieta es retenido. Sin embargo en animales no rumiantes su absorción de la dieta representa un 77% (Podoll *et al.*, 2002).

Otros factores que afectan la absorción de selenio en los rumiantes, es el tipo de dieta, la cual puede disminuir el pH ruminal afectando el porcentaje de absorción; además de la concentración en la dieta de otros minerales, como el S, Hg, Ag y el Cu que compiten por los sitios de absorción con el selenio; así como también la forma química del selenio, ya que la forma inorgánica (selenito de sodio) es más rápidamente reducida por los microorganismos del rumen que el selenio orgánico, el cual ofrece una mayor protección contra su deficiencia en los animales (Hall *et al.*, 2009 y 2012).

La eliminación de selenio en los rumiantes se lleva a cabo principalmente a través de las heces, pero también se realiza de forma rápida a través de orina, bilis, leche, sudor y aire exhalado (Gresáková *et al.*, 2013). Las heces constituyen

la principal vía de excreción del selenio administrado oralmente a rumiantes adultos (Alimohamady *et al.*, 2013).

El selenio administrado por vía intravenosa o subcutánea se excreta en mayor cantidad con la orina y menos con las heces. Antes de que se desarrolle la función del rumen, los corderos jóvenes alimentados con leche excretan más selenio en la orina y en menor proporción en las heces que los animales adultos (Alimohamady *et al.*, 2013).

## **CAPITULO II. REPORTES SOBRE EL EFECTO DEL SELENIO EN CORDEROS Y EN LA OVEJA.**

La forma más frecuente de selenio disponible para los animales ocurre por la ingestión de plantas que han acumulado este elemento a partir del suelo (Hall *et al.*, 2009 y 2012; Alhidary, 2016). Ordoñez (1989), realizó un estudio en el municipio de San Felipe del Progreso; Edo, de México, determinando un rango de concentración en el suelo de 0.01 a 0.02 ppm, considerándose estos niveles por debajo de los estimados como adecuados (0.1 a 0.5 ppm); mientras que para el pasto se obtuvieron valores de 0.03 a 0.12 ppm (Díaz, 1993). Ocasionando que los corderos procedentes de madres selenodeficientes sean seriamente afectados por su baja en la ganancia de peso, el pobre desarrollo por la atrofia de masas musculares, además de tener mayor susceptibilidad a enfermedades (Domínguez y Huerta, 2008).

Se han observado efectos positivos sobre la ganancia de peso e incremento en la fertilidad de las ovejas, el número de corderos nacidos, así como un mayor peso vivo al nacimiento, cuando se mantienen niveles adecuados de selenio en la dieta o por la aplicación de una dosis óptima de selenito de sodio (0.05 ppm) (Dangla, 1994).

Con base en esto, la deficiencia de selenio observada frecuentemente, ha sugerido a los fabricantes de piensos adicionar a las dietas para rumiantes pequeños niveles de selenio, y generalmente estas son de 0.1 mg Se/kg (Vanegas, 1996). Sin embargo, trabajos realizados en áreas de producción ovina en el Estado de México, marcadas como selenodeficientes, establecen que la dosis de selenio recomendada por el fabricante (5 mg/mL de selenio por cada 100 kg) no incide de manera significativa en los niveles de selenio en sangre de ovejas provenientes de estas áreas (Dangla, 1994).

Vanegas (1996) al aplicar dosis mayores de selenio (10 mg/45 kg de peso corporal) a las recomendadas comercialmente, observó que en grupos de ovejas tratadas con dosis de selenio mayores, lograron llegar a niveles considerados como normales (0.1 ppm) después de la primera aplicación, manteniéndose niveles de selenio en sangre durante mayor tiempo.

Otros estudios demuestran que la aplicación de dosis altas de selenito de bario a ovejas que consumen dietas deficientes del micromineral, presentaron niveles 4 veces superior a las concentraciones de selenio en sangre que el grupo control, pero sin presentar diferencias estadísticas significativas en cuanto al peso al nacer y ganancia de peso de corderos provenientes de animales tratados y no tratados (Humann-Ziebank *et al.*, 2013).

Se ha observado que la aplicación de inyecciones a partir de compuestos conteniendo selenio a ovejas grávidas 90, 60 y 30 días antes de la fecha estimada para el parto, evita la aparición de la enfermedad del músculo blanco y aumento la concentración de selenio, así como el nivel de GSH-Px en el suero sanguíneo de los corderos (Dangla, 1994). En otros trabajos se estableció que la actividad de la GSH-Px y la concentración de selenio en sangre declinan durante la preñez y lactación, teniendo que suministrar mayor cantidad de selenio en estas etapas (Díaz, 1993).

En algunos países se ha vuelto una práctica normal dosificar a ovejas con selenito de sodio como preventivo, principalmente contra el desarrollo de enfermedades de músculo blanco, recomendándose dosificar a ovejas con 10 mg de Se antes del mes de apareamiento y nuevamente 5 mg de Se un mes antes del nacimiento del cordero, mientras que en corderos la recomendación es dosificar con 5 mg de Se al marcado o destete y a los 6 meses de edad (FDA, 2012).

En estudios realizados para evaluar la toxicidad aguda del selenio administrado en forma parenteral, se demostró que la dosis DL<sub>50</sub> fue de 0.8 mg Se/kg de peso corporal, encontrándose por arriba de la reportada en la literatura bajo la misma forma de administración con dosis de DL<sub>50</sub> 0.455 mg Se/kg de peso corporal, determinando, que esta variación es debida a factores asociados con la dieta y la susceptibilidad individual del animal (Gresáková *et al.*, 2013).

En otros trabajos el efecto que ejerce la suplementación de selenio sobre el peso corporal, la sobrevivencia y el peso del vellón, es favorable, ya que disminuye la mortalidad de los corderos y aumenta el peso del vellón por el acrecentamiento en longitud y diámetro de la fibra. Sobre el peso corporal, la suplementación con Se mejora el peso del descanso de estación y la ganancia en peso por año (2.4 kg mayor con respecto al grupo control), pero no se favorece el peso al destete (Khanal y Knight, 2010).

Estudios que correlacionan la suplementación de selenio, con la ganancia de peso corporal, en áreas designadas como marginalmente selenodeficientes, los corderos mostraron una pequeña pero significativa respuesta en el peso con la dosis de selenito de sodio de 10 mg Se/cordero por mes, en la cual se obtuvo un promedio de ganancia de peso de 1.2 kg para el grupo control y de 2.3 kg para el grupo tratado con Se, desde el inicio de la prueba hasta 6 semanas después, estableciendo que la respuesta no es evidente hasta antes de los tres meses de edad, donde la pequeña significancia en la respuesta al peso con la dosis de selenio está asociada con el promedio de los niveles de Se en sangre; mientras que en el estudio realizado por Alimohamady *et al.* (2013), en el que aplicaron Se-vit. E con un tratamiento antihelmíntico simultáneo se obtuvo una ganancia de peso de 5.48 kg (17.35%) más que el grupo control.

### **CAPITULO III. PARTICIPACION DEL SELENIO EN LA RESPUESTA INMUNOLOGICA EN CORDEROS.**

La inmunidad humoral está mediada por moléculas con especificidad para el antígeno, y los anticuerpos son producidos a distancia de su sitio de acción. La inmunidad humoral se transmite fácilmente por el suero y más difícilmente por las células, caso inverso lo que ocurre en la respuesta mediada por las células (Kindt *et al.*, 2007; Tizard, 2009).

En la inmunidad mediada por las células, intervienen células específicamente sensibilizadas que llegan a tener contacto con el antígeno y actúan por citotoxicidad directa o liberación de mediadores inespecíficos del antígeno. Las dos mejores respuestas inmunes, son referidas como el estudio de la inmunidad activa en los corderos, y resulta complicado debido a la variación en cantidad y calidad de calostro ingerido durante las primeras horas, además de la absorción de anticuerpos que influyen marcadamente en la producción activa de anticuerpos (Kindt *et al.*, 2007; Tizard, 2009).

Las inmunoglobulinas son proteínas séricas de elevado peso molecular, distinguiéndose 5 clases de anticuerpos, con antigenicidad, estructura y funciones independientes.

Las clases de inmunoglobulinas séricas que se han reconocido en los ovinos son: IgG (IgG<sub>1</sub> e IgG<sub>2</sub>), IgA (sérica y secretora) e IgM, presentes en sangre y en la mayoría de las secreciones, variando en sus concentraciones relativas dependiendo del fluido examinado (Tizard, 2009; Gutiérrez, 2010).

La diferencia en absorción entre las clases de inmunoglobulinas ha indicado que la IgG se absorbe solo en un 90%, la IgM en un 59%, mientras que la IgA en



un 48%, además de la importancia en cuanto a tiempo para que se lleve a cabo esta absorción.

Por lo tanto la IgG, es el tipo de anticuerpo que se encuentra en mayor concentración en el suero. Debido a su tamaño pequeño escapa fácilmente del torrente circulatorio a los sitios de inflamación aguda. La IgG participa eficazmente en reacciones de aglutinación, opsonización y precipitación de diversos antígenos, además de activar al sistema del complemento (Tizard, 2009; Gutiérrez, 2010).

Las diferencias antigénicas en particular entre IgG<sub>1</sub> e IgG<sub>2</sub> provenientes del suero como del calostro se han demostrado por estudios de inmunodifusión. La IgG<sub>1</sub> es la que se encuentra principalmente en el calostro, y en menor cantidad la IgG<sub>2</sub>, IgM e IgA; de estas la IgG<sub>1</sub> es la única que persiste solo hasta los 60 días posparto, mientras que las demás persisten por 12 días (Kindt *et al.*, 2007; Tizard, 2009; Gutiérrez, 2010).

El selenio como micronutriente esencial asociado con la vitamina E afecta diversas funciones del animal, como alteraciones en la reproducción y a los sistemas: nervioso, muscular, esquelético, hematopoyético e inmune, en sus características básicas y de integridad celular (Burk y Hill, 2009).

La GSH-Px que depende del selenio presente en la dieta desempeña un papel importante en la detoxificación de peróxidos lípidos reduciéndolos a hidroxiácidos grasos no tóxicos y la vitamina E evita la transformación de ácidos hidroperóxidos grasos. Cuando existe deficiencia de selenio, los niveles plasmáticos de los peróxidos se incrementan rápidamente, causando daño en los endotelios capilares, glóbulos rojos, células plasmáticas y fibras musculares entre otros, modificando el estado homeostático celular al dañar la actividad metabólica de la membrana; lo que se relaciona con la reducción de títulos de anticuerpos,

reflejando una inmunosupresión; así las deficiencias de selenio reducen significativamente la respuesta inmune humoral y la función inmune no específica (Hoffmann, 2007; Hall *et al.*, 2013 a y b).

Las deficiencias de selenio comprometen la inmunidad y cuando existe suplementación con selenio y vitamina E, se presenta un incremento en la respuesta humoral mediada por anticuerpos (Ig) y respuesta celular mediada por células T y macrófagos (Ibeagha *et al.*, 2009).

Las células fagocitarias, como neutrófilos y macrófagos de animales selenodeficientes han mostrado reducida actividad y cantidad de GSH-Px y disminución de la actividad microbica (Kumar *et al.*, 2009).

Las deficiencias de selenio y vitamina E, predisponen a una baja actividad de la GSH-Px, por lo tanto una disminución en los niveles de inmunoglobulinas, baja actividad fagocitaria y mayor destrucción de los macrófagos. De tal forma, el sistema inmune requiere de adecuados niveles de selenio para su óptimo funcionamiento, ya que cuando existen deficiencias en la dieta, afectan negativamente a la respuesta inmune observándose bajos niveles de anticuerpos en respuesta a vacunaciones y la aplicación de selenio potencializa un efecto protector (Qin *et al.*, 2007).

Además de la reducción de la actividad de la GSH-Px en los neutrófilos, ha sido reportada por deprimir la actividad fagocítica y microbica de los neutrófilos; y que bajos títulos de anticuerpos en corderos selenodeficientes, derivan de una pobre actividad de GSH-Px sanguínea incrementándose la destrucción de células linfoides por altos niveles de peróxidos circulantes (Turner *et al.*, 1998).

La protección que confiere la GSH-Px a las membranas y organelos celulares contra el daño oxidativo, que ocurre por efecto de los radicales de oxígeno, al detoxificar peróxidos lipídicos, que se producen durante el metabolismo oxidativo, reduciéndolos a hidroxiácidos grasos no tóxicos, mientras que la vitamina E evita la formación de ácidos hidroperóxidos grasos, siendo este efecto de gran relevancia para la respuesta mitogénica de los linfocitos y la función de los macrófagos, ya que en el proceso de estimulación de los linfocitos los mitógenos atacan a los receptores apropiados de los linfocitos y comienzan una serie de eventos metabólicos, lo que tiene una gran asociación con el incremento en la actividad de algunos sistemas enzimáticos (Evenson *et al.*, 2004).

Los peróxidos de hidrógeno, substratos de la GSH-Px actúan a través de la mieloperoxidasa, para ayudar a destruir las partículas ingeridas dentro del neutrófilo. La GSH-Px puede también tener un papel en la regulación del flujo de intermediarios del metabolismo del ácido araquidónico a través de lipoxigenasa y cicloxigenasa (Ghaffari *et al.*, 2011).

Durante el proceso de fagocitosis en el sistema sanguíneo se produce un importante incremento en el metabolismo oxidativo, cuando se consumen partículas extrañas, con producción de grandes cantidades de peróxidos de hidrógeno y oxígeno, que se forman durante los procesos biológicos de oxidación, tales como el estallido oxidativo de los fagocitos y los peróxidos lípidos formados durante la cadena de reacciones de los radicales libres; estos peróxidos son los substratos de la GSH-Px, como agente bactericida (Ghaffari *et al.*, 2011).

Los hidroperóxidos lípidos se producen durante la fagocitosis de los neutrófilos y son conocidos por inhibir a la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ambas enzimas son envueltas en la producción

de NADPH usado en la destrucción oxidativa de partículas ingeridas por los neutrófilos (Hall, 2013 b).

La activación de fitohemaglutinina (PHA) de los macrófagos ha sido asociada a la aparición de grandes vacuolas, sugiriendo un marcado daño en la organización de los organelos intracelulares. Estos disturbios se asocian con la producción de peróxido intracelular, comprometiendo la actividad de la GSH-Px de las células por la deficiencia de selenio, produciendo un daño celular reflejado por una reducción en la función extracelular por la liberación de peróxidos de hidrógeno (Ibeagha *et al.*, 2009).

La producción de oxígeno reactivo por los fagocitos contribuye a su actividad microbicida y las sustancias inhibidoras producidas durante la fagocitosis son: hidroperóxidos lípidos, aniones, superóxidos, oxígeno simple, peróxidos de hidrógeno, radicales hidroxilo y prostaglandinas, las cuales pueden escapar de la célula desde el fagosoma, hacia el citoplasma y este escape puede ser la causa potencial de daño de células fagocíticas y sus funciones metabólicas. El incremento de la actividad inflamatoria crónica producido por los agentes oxidantes produce daño en linfocitos por lo que compromete la mitogénesis, altera la función de los macrófagos y otras células de defensa cuando hay bajos niveles de selenio y propiamente de GSH-Px, estos datos proveen un soporte al papel del selenio en los procesos inmune e inflamatorio (Juniper *et al.*, 2008 y 2009).

La baja actividad de la GSH-Px predispone a bajos niveles de inmunoglobulinas, baja actividad fagocitaria y una mayor destrucción de macrófagos. El daño producido por el oxígeno tóxico, induce a una reducción en la actividad fagocítica de los polimorfonucleares cuando la dieta es baja en selenio (Juniper *et al.*, 2009).

El reporte de varios estudios indican que el selenio puede ser responsable de alterar la respuesta inmune, reduciendo la capacidad de los animales para responder ante desafíos antigénicos, por el efecto depresivo en la síntesis de anticuerpos neutralizantes (Hoffmann, 2007; Hall *et al.*, 2013a).

Se ha observado que los corderos que muestran niveles bajos de selenio y vitamina E en sangre, con baja actividad de Glutación Peroxidasa presentaron una disminución de los niveles de inmunoglobulinas, baja actividad fagocitaria, y mayor destrucción de los macrófagos y en perros una pobre respuesta a la Fitohemaglutinina (PHA), Concanavalina A (Con A) respuesta Mitogenica y Estreptolisina O (PWM); en contraste en cerdos suplementados con vitamina E y selenio se incrementa la respuesta linfocitaria a la fitohemaglutinina. Los bajos títulos de anticuerpos en corderos selenodeficientes, derivan de una pobre actividad de la GSH-Px sanguínea incrementándose la destrucción de las células linfoides por los altos niveles de peróxidos circulantes (Kumar *et al.*, 2009; Liu *et al.*, 2012).

En el estudio realizado por Hall *et al.* (2013a), usando como modelo la afección por bacterias que causan gabarro (*Dichelobacter nodosus*, bacteria que en muchos casos se encuentra asociada a *Fusobacterium necrophorum*), en ovinos estabulados y en pastoreo, demostraron que la suplementación superior a los niveles recomendados en ovejas con Se-levadura a razón de 24.5 mg Se/kg mejoró el crecimiento de los corderos y la salud de las ovejas en comparación con los niveles máximos permitidos por la FDA. En este estudio, la suplementación de Se no previno la infección de gabarro, sino que, mejoró la función inmune innata y humoral que había sido valorada, en donde se encontraban afectadas negativamente por la infección. Aunque, se necesita continuar evaluando la suplementación de Se, y determinar si tiene efecto adicional sobre la respuesta inmune innata y adaptativa y proporciona protección contra otros patógenos bacterianos o virales.

## **LÍMITE DE ESPACIO**

El trabajo se realizó en las salas de estudio y bancos de información (base de datos), de los siguientes centros:

Biblioteca Central del Cerrillo Piedras Blancas, de la Unidad *Campus* el Cerrillo de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de Palo Alto. México, D.F.

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.

Biblioteca de la Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.

## XI. LÍMITE DE TIEMPO

El trabajo se realizó en el período comprendido de noviembre de 2016 a marzo de 2017; para la elaboración del documento se incluyó la información más relevante sobre el tema, en donde destacaron las fases de búsqueda y recolección de información, análisis y elaboración de fichas bibliográficas y redacción del documento.

### Cronograma de actividades

Actividad	Nov-Dic 2016	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017
Búsqueda y recolección de información	X	X		
Análisis y elaboración de fichas bibliográficas	X	X		
Redacción de protocolo	X	X	X	
Redacción del documento final			X	X

## LITERATURA CITADA

- Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (2012). Code of Federal Regulations Title 21 - Food and Drugs Chapter 1 -Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services Subchapter E - Animal drugs, feeds, and related products Part 573 - Food additive permitted in feed and drinking water of animals Subpart B - Food Additive Listing Section 573920 – Selenium.
- Alhidary, I.A., Abdelrahman, M.M., Khan, R.U., Haroon, R.M. (2016). Antioxidant status and immune responses of growing camels supplemented a long-acting multi-trace minerals rumen bolus. *Italian J Anim Sci* 15:343–349.
- Alimohamady, R.; Aliarabi, H.; Bahari, A.; Dezfoulian, A.H. (2013). Influence of different amounts and sources of selenium supplementation on performance, some blood parameters, and nutrient digestibility in lambs. *Biol. Trace Elem. Res.*, 154:45-54.
- Almanza V. A. (2004): La ovinocultura en México avanza en todo el país. *Ovinos*. <<http://www.rumela.org/modules.php?name=mewsfile=articlesid=252.htm>> (18 de enero 2017).
- Beilstein, M.A.; Whanger, P.D. (2005). Selenium accumulation tissues, tissue fractions and cytosolic proteins in rats. *Biochem. Arch.*, 1:153-162.
- Burk, R.F.; Hill, K.E. (2009). Selenoprotein P-expression, functions, and roles in mammals. *Biochim Biophys Acta*, 1790:1441-1447.
- Chung, J.Y.; Kim, J.H.; Ko, Y.H.; Jang, I.S. (2007). Effects of dietary supplemented inorganic and organic selenium on antioxidant defense systems in the intestine, serum, liver and muscle of Korean native goats. *J. Anim. Sci.*, 20:52-59.
- Church, D.C.; Pond, W.G.; Pond, K.R. (2002). *Fundamentos de Nutrición y Alimentación de Animales*. 2a ed. Limusa.Mexico. D.F.
- Conzález-Calvo, L.; Joy, M.; Alberti, C.; Ripoll, G.; Molino, F.; Serrano, M.; Calvo, J.H. (2014). Effect of finishing period length with  $\alpha$ -tocopherol



supplementation on the expression of vitamin E-related genes in the muscle and subcutaneous fat of light lambs. *Gene*, 552:225-233.

Dangla, L.R.A. (1994). Determinación de los niveles de selenio e IgG séricas en Ovejas adultas con y sin tratamiento de selenio durante la gestación, parto y lactancia y en sus corderos durante el parto y lactancia en una explotación del Valle de Toluca, Estado de México. Tesis de Maestría. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UAEMéx.

Díaz, Z.S. (1993). Determinación de la actividad de Glutation Peroxidasa (GSH-Px) y niveles de selenio en sangre de ovinos y niveles de selenio en suelo y pasto de áreas ovinas de San Felipe del Progreso, México. Tesis de Maestría. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UAEMéx.

Domínguez, V.I.A.; Huerta, B.M. (2008). Concentración e interrelación mineral en suelo, forraje y suero de ovinos durante dos épocas en el Valle de Toluca, México. *Agrociencia*, 42: 173-183.

Eun, J.S.; Davis, T.Z.; Vera, J.M.; Miller, D.N.; Panter, K.E.; ZoBell, D.R. (2013). Addition of high concentration of inorganic selenium in orchardgrass (*Dactylis glomerata* L.) hay diet does not interfere with microbial fermentation in mixed ruminal microorganisms in continuous cultures. *J. Anim. Sci.*, 29:39-45.

Evenson, J.K.; Wheeler, A.D.; Blake, S.M.; Sunde, R.A. (2004). Selenoprotein mRNA is expressed in blood at levels comparable to major tissues in rats. *J. Nutr.*, 134:2640-2645.

Ferguson, L.R.; Karunasinghe, N. (2011). Nutrigenetics, nutrigenomics, and selenium. *Front Genet.*, 25:2-15.

Freeman, J.L.; Zhang, L.H.; Marcus, M.A.; Fakra, S.; McGrath, S.P.; Pilon-Smits, E.A.H. (2006). Spatial imaging, speciation, and quantification of selenium in the hyperaccumulator plants *Astragalus bisulcatus* and *Stanleya pinnata*. *Plant Physiol.*, 142:124-134.

- Ghaffari, T.; Nouri, M.; Irannejad, E.; Rashidi, M.R. (2011). Effect of vitamin e and selenium supplement on paraoxonase-1 activity, oxidized low density lipoprotein and antioxidant defense in diabetic rats. *Bioimpacts*, 1:121-128.
- Gresáková, L.; Cobanová, K.; Faix, S. (2013). Selenium retention in lambs fed diets supplemented with selenium from inorganic or organic sources. *Small Rumin. Res.*, 111:76-82.
- Gutiérrez, P.J.A. (2010). *Inmunología Veterinaria. Manual Moderno*. Colombia.
- Hall, J.A.; Van Saun, R.J.; Nichols, T.; Mosher, W.; Pirelli, G. (2009). Comparison of selenium status in sheep after short-term exposure to high-selenium-fertilized forage or mineral supplement. *Small Ruminant Res.*, 82:40-45.
- Hall, J.A.; Van Saun, R.J.; Bobe, G.; Stewart, W.C.; Vorachek, W.R.; Mosher, W.D.; Nichols, T. (2012). Organic and inorganic selenium: I. Oral bioavailability in ewes. *J. Anim. Sci.*, 90:568-576.
- Hall, J.A.; Bobe, G.; Vorachek, W.R.; Hujeriletu, G.M.E.; Mosher, W.D.; Pirelli, G.J. (2013a). Effects of feeding selenium-enriched alfalfa hay on immunity and health of weaned beef calves. *Biol. Trace Elem. Res.*, 156:96-110.
- Hall, J.A.; Vorachek, W.R.; Stewart, W.C.; Gorman, M.E.; Mosher, W.D.; Pirelli, G.J.; Bobe, G. (2013b). Selenium supplementation restores innate and humoral immune responses in footrot-affected sheep. *PLoS One*, 8:82-91.
- Hall, J.A.; Bobe, G.; Nixon, B.K.; Vorachek, W.R.; Hujeriletu, N.T.; Mosher, W.D.; Pirelli, G.J. (2014). Effect of transport on blood selenium and glutathione status in feeder lambs. *J. Anim. Sci.*, 92:4115-4122.
- Hoffmann, P.R. (2007). Mechanisms by which selenium influences immune responses. *Arch. Immunol. Ther. Exp.*, 55:289-297.
- Huang, Z.H.; Luque, R.M.; Kineman, R.D.; Mazzone, T. (2007). Nutritional regulation of adipose tissue apolipoprotein E expression. *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.*, 293:203-209.

- Humann-Ziehank, E.; Renko, K.; Mueller, A.S.; Roehrig, P.; Wolfsen, J.; Ganter, M. (2013). Comparing functional metabolic effects of marginal and sufficient selenium supply in sheep. *J. Trace Elem. Med. Biol.*, 27:380-390.
- Ibeagha, A.E.; Ibeagha-Awemu, E.M.; Mehrzad, J.; Baurhoo, B.; Kgwatalala, P.; Zhao, X. (2009). The effect of selenium sources and supplementation on neutrophil functions in dairy cows. *Animal* 3:1037-1043.
- Juniper, D.T.; Phipps, R.H.; Ramos-Morales, E.; Bertin, G. (2008). Selenium persistency and speciation in the tissues of lambs following the withdrawal of dietary high-dose selenium-enriched yeast. *Animal*, 2:375-380.
- Juniper, D.T.; Phipps, R.H.; Ramos-Morales, E.; Bertin, G. (2009). Effect of high dose selenium enriched yeast diets on the distribution of total selenium and selenium species within lamb tissues. *Livest. Sci.*, 122:63-67.
- Khanal, D.R.; Knight, A.P. (2010). Selenium: its role in livestock health and productivity. *J. Agric. Environ.*, 11:101-106.
- Kindt, T.J., Goldsby, R.A.; Osborne, R.A. (2007). *Inmunología*. 6<sup>a</sup> ed. Mc Graw-Hill. México, D.F.
- Kumar, N.; Garg, A.K.; Dass, R.S.; Chaturvedi, V.K., Mudgal, V., Varshney, V.P. (2009). Selenium supplementation influences growth performance, antioxidant status and immune response in lambs. *Anim. Feed Sci. Technol.*, 153:77-97.
- Liu, Y.; Zhao, H.; Zhang, Q.; Tang, J.; Li, K.; Xia, X.J. (2012). Prolonged dietary selenium deficiency or excess does not globally affect selenoprotein gene expression and/or protein production in various tissues of pigs. *J. Nutr.*, 142:1410-1416.
- Mainville, A.M.; Odongo, N.E.; Bettger, W.J.; McBride, B.W.; Osborne, V.R. (2009). Selenium uptake by ruminal microorganisms from organic and inorganic sources in dairy cows. *Can. J. Anim. Sci.*, 89:105-110.

- Mehdi, Y.; Hornick, J.L.; Istasse, L.; Dufrasne, I. (2013). Selenium in the environment, metabolism and involvement in body functions. *Molecule*,18:3292-3311.
- Netto, A.S.; Zanetti, M.A.; Claro, G.R.; de Melo, M.P.; Vilela, F.G.; Correa, L.B. (2014). Effects of copper and selenium supplementation on performance and lipid metabolism in confined brangus bulls. *J. Anim. Sci.*, 27:488-494.
- National Research Council (NRC) (2007). Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids. Washington DC: National Academy Press.
- Ordoñez, R.J.A: (1989). Determinación de los niveles de selenio, cobre y cobalto en suero, lana y heces de corderos de la raza corridale, suelos y forrajes de una explotación ovina del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de Mexico. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UAEMéx.
- Pavlata, L.; Chomat, M.; Pechova, A.; Misurova, L.; Dvorak, R. (2011). Impact of long-term supplementation of zinc and selenium on their content in blood and hair in goats. *Vet. Med.*, 56:63-74.
- Podoll, K.L.; Bernard, J.B.; Ullrey, D.E.; DeBar, S.R.; Ku, P.K.; Magee, W.T. (2002) Dietary selenate versus selenite for cattle, sheep, and horses. *J. Anim. Sci.*, 70:1965-1970.
- Qin, S.; Gao, J.; Huang, K. (2007). Effects of different selenium sources on tissue selenium concentrations, blood GSH-Px activities and plasma interleukin levels in finishing lambs. *Biol. Trace Elem. Res.*, 116:91-102.
- Ramírez, B.E.; Hernández, C.E.; Hernández, C.L.M.; Tórtora, P.J.L. (2004). Effect of parenteral supplement with sodium selenite on lamb mortality and hematic values of selenium. *Agrociencia*, 38:43-51.
- Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (2008): Población Ganadera México. <[http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar\\_compec\\_pobgan.html](http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_compec_pobgan.html)> (11 Enero 2017).

- Spears, J.W. (2003). Trace mineral bioavailability in ruminants. *J. Nutr.*, 133:1506-1509.
- Stewart, W.C.; Bobe, G.; Vorachek, W.R.; Pirelli, G.J.; Mosher, W.D.; Nichols, T.; Van Saun, R.J. (2012). Organic and inorganic selenium: II. Transfer efficiency from ewes to lambs. *J. Anim. Sci.*, 90:577-584.
- Tizard, I.R. (2009). *Introducción a la Inmunología Veterinaria*. 8ª ed. Saunders, Elsevier. España.
- Turner, R.J.; Weiner, J.H.; Taylor, D.E. (1998). Selenium metabolism in *Escherichia coli*. *Biometals*, 11:223-227.
- Underwood, E.J.; Suttle, N.F. (2002) *Los minerales en la nutrición del ganado*. 3a ed. Acribia, España.
- Vanegas, M.C.S. (1996). Evaluación del efecto de la suplementación de selenio y vitamin E sobre los niveles de IgG totals y específicas al antígeno F5+ de *Escherichia coli* en ovejas durante la gestación y lactancia y corderos lactantes. Tesis de Maestría. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UAEMéx.
- Velázquez, O.V., Valladares, C.B., Alonso, F.M.U., Barbabosa, P.A., Zamora, E.J.I., Pérez, S.L.S., Acosta, D.J.P., Gutiérrez, C.A.C., Díaz, Z.S., Bedolla, C.C., Castañeda, V.H., Carro T.S. (2015). Selenio y Vitamina E en la producción y salud del hato lechero. En: *Producción y Calidad de la leche*. Juan Pablos Editor S.A. México, D.F. pp. 319-340.
- Whanger, P.D. (2002). Selenocompounds in plants and animals and their biological significance. *J. Am. Coll. Nutr.*, 21:223-232.
- Wu. L.; Guo, X.; Banuelos, G.S. (2007). Accumulation of seleno-amino acids in legume and grass plant species grown in selenium-laden soils. *Environ. Toxicol. Chem.*, 16:491-497.
- Zhou, J.; Huang, K.; Lei, X.G. (2013). Selenium and diabetes-evidence from animal studies. *Free Radic. Biol. Med.*, 65:1548-1556.